

EXAMEN GRAD PRINCIPAL

sesiunea 2013

SPECIALITATEA: ASISTENT STOMATOLOGIE

TEST GRILA:

INTREBARI CU UN SINGUR RASPUNS CORECT DIN TREI

Prin raspuns corect se intelege completarea grilei de raspuns, prin umplerea cercului corespunzator literei cu raspunsul corect. La umplerea a doua sau trei cercuri si/sau in cazul taierii cu X a unui cerc umplut, intrebarea respectiva se noteaza cu 0 puncte. Fiecare intrebare cu raspuns corect se noteaza cu 1 punct.

1. Medicamentele sunt substante extrase din:

- a. produse de origine minerala
- b. produse de origine animala
- c. sunt extrase sau sintetizate din produse de origine minerala, vegetala sau animala

2. Acelasi produs în functie de doza poate actiona ca:

- a. aliment
- b. medicament
- c. aliment, medicament, toxic

3. Doza maxima a unui medicament este:

- a. doza care conduce la deces
- b. doza administrata în cantitatea cea mai mare fara actiune toxica asupra organismului
- c. doza administrata în scop terapeutic fara efect toxic

4. Medicamentele sunt depozitate în :

- a. dulapuri speciale
- b. dulapuri compartimentate
- c. noptiere

5. Asistenta medicala efectueaza administrarea medicamentelor în conditii de:

- a. igiena, aseptie, sterilizare
- b. de dezinfectie
- c. de igiena, aseptie, dezinfectie si mentinerea normelor de control a infectiilor nosocomiale

6. Doza unui medicament lichid folosit cu un pahar de apa este:

- a. 50 g apa
- b. 15 g apa
- c. 200 g apa

7. O lingurita cu vârf de pulbere are capacitatea de:

- a. 15 – 25 g
- b. 0,5- 1 g
- c. 2,5 – 5 g

8. Câte picaturi are un gram de solutie apoasa:

- a. 45-50 picaturi
- b. 20-25 picaturi
- c. 60-65 picaturi

9. Câte picaturi are un gram de solutie uleioasa:

- a. 50-60 picaturi
- b. 45-50 picaturi
- c. 30-40 picaturi

10. Cantitatea maxima de solutie în care se dizolva substanta medicamentoasa este de:

- a. 100-200 ml
- b. 1000-2000 ml
- c. 10-15 ml

11. Pentru pacientul cu intoleranta digestiva sau interventii chirurgicale la nivelul tubului digestiv este recomandata calea:

- a. rectala
- b. orala
- c. respiratorie

12. Injectia subcutanata apartine obligatiilor asistentei si consta în:

- a. efectuarea injectiei în tesutul muscular
- b. efectuarea injectiei sub piele în tesutul celular subcutan sau hipodermic
- c. efectuarea injectiei în grosimea pielii

13. Fiola deschisa este mentinuta cu:

- a. policele, indexul si mediusul mâinii stângi
- b. policele si mediusul mâinii drepte
- c. policele si indexul mâinii stângi

14. Înaintea executarii injectiilor o etapa obligatorie este:

- a. dezinfectia pielii
- b. dezinfectia igienica a mâinii
- c. spalarea mâinilor

15. Hipoglicemia poate fi provocata de:

- a. o doza prea mare de insulina
- b. o doza minima de insulina decât cea prescrisa
- c. aport alimentar mai bogat decât cel planificat în dieta

16. Insulina se pastreaza:

- a. la rece (frigider)
- b. congelator
- c. în dulapul de medicamente dar ferit de lumina

17. Anticoagulantele injectabile se fac la pacient aflat în pozitie de:

- a. decubit lateral
- b. decubit ventral
- c. decubit sau sezând.

18. Garoul elastic se aplica deasupra locului punctiei la aproximativ:

- a. 10 cm
- b. 20 cm
- c. 5 cm

19. Valabilitatea sângelui integral este:

- a. 21 zile
- b. 3 zile
- c. 14 zile

20. Valabilitatea plasmei uscate este de:

- a. 10 ani
- b. 9 luni
- c. 1 an

21. Tratamentul contuziei dentare consta în:

- a. extractia dintelui;
- b. imobilizarea dintelui cu ligaturi de sârma;
- c. fara tratament;

22. Testul de vitalitate în leziunile dento-parodontale are valoare diagnostica dupa:

- a. doua saptamâni
- b. o luna
- c. 4-6 luni

23. Fracturile radiculare ale dintilor temporari au indicatii de:

- a. imobilizare
- b. tratament endodontic
- c. extractie

24. În fracturile coronare necomplicate pacientul acuza:

- a. dureri spontane
- b. sângerarea pulpei dentare
- c. durere pulsatila

25. Subluxatia dentara posttraumatica produce:

- a. hemoragie în santul gingival
- b. hemoragie în camera pulpara
- c. extruzia dentara

26. Fracturile radiculare sunt mai frecvente:

- a. la dentitia mixta
- b. la dentitia temporara
- c. la dentitia permanenta

27. Chistul radicular are initial forma:

- a. sferica
- b. neregulata
- c. bilobat

28. Grupa de vârsta cea mai expusa fracturilor de mandibula prin agresiune :

- a. 18-20 ani
- b. 35-55 ani
- c. 20-40 ani

29. Eritroplazia poate avea urmatoarele faze:

- a. eritematoasa
- b. eroziva
- c. hipetrofica

30. Riscul de malignizare a leucoplaziei este:

- a. în cazul igienei orale defectuoase
- b. mai mare la barbati
- c. mai mare la tineri

31. Parotiditele cronice nespecifice pot fi favorizate de:

- a. artrite acute temporo-mandibulare
- b. actinomicoza parotidiana
- c. megastenon

32. Tumora salivara este:

- a. o tumora mixta
- b. o tumora benigna
- c. o sialadenita cronica

33. Supuratiile difuze (flegmoanele) sunt:

- a. procese infectioase
- b. procese inflamatorii
- c. procese virale

34. Din totalul infectiilor osoase, infectiile oaselor maxilare reprezinta peste:

- a. 50%
- b. 20%
- c. 40%

35. Exteriorizarea unui carcinom mandibular cu debut profund se caracterizeaza prin:

- a. mase burjonate, sângerânde, acoperite de depozite cenusii, fetide
- b. durere
- c. gingivite acute

36. Sindesmotoamele sunt:

- a. instrumente asemanatoare elevatoarelor
- b. instrumente pentru examinat
- c. instrumente pentru anestezie

37. Consistenta cimentului fosfat de Zn trebuie sa fie:

- a. de smântâna sau crema
- b. chitoasa
- c. dura

38. Instrumentele folosite pentru condensarea amalgamului sunt:

- a. fuloare
- b. excavatoare
- c. instrumente de mâna si ciocan special

39. La nivelul zonei linguale centrale, marginea lingurii individuale trebuie sa fie:

- a. mai subtire, pentru a mentine contractia genioglosului
- b. mai groasa pentru a realiza cu mai multa usurinta închiderea marginala
- c. mai scurta cu 1mm.

40. Igienizarea protezelor de catre pacient se realizeaza prin:

- a. spalare cu apa si sapun
- b. spalare cu alcool si clatire cu apa
- c. nu este necesara igienizarea

41. Alegerea materialului si a tehnicii de amprentare preliminara se face în functie de:

- a. dotarea cabinetului
- b. dotarea laboratorului
- c. duritatea câmpului protetic

42. La pacientul cu teren patologic cine stabileste diagnosticul si cine pune avizul pentru începerea îngrijirilor stomatologice?

- a. medicul de familie
- b. medicul stomatolog
- c. medicul specialist

43. Instrumentarul pentru diagnostic curpinde:

- a. ace, seringi, stetoscop
- b. stetoscop, aparat de masurat TA, Glucostix (aparat de masurat glucoza în sânge)
- c. masti respiratorii, laringoscop

44. Semnele si simptomele de avertisment în insuficienta respiratorie acuta (IRA):

- a. cianoza, ortopnee, bradipnee, sunete respiratorii patologice
- b. frica, neliniste
- c. agitatie, dereglari ale constientului

45. Simptomele de însoțire a IRA (insuficienta respiratorie acuta)sunt:

- a. tiraj , cornaj
- b. respiratie inversa sacadata
- c. neliniste, agitatie, frica, dereglari ale constientului

46. Periajul manual este:

- a. un act constient
- b. un act inconstient
- c. un act reflex

47. Tehnicile de periaj pot fi clasificate în functie de:

- a. tipul de pasta de dinti
- b. în functie de miscarile periutei
- c. în functie de clatirea cavitatii orale

48. Dusurile bucale îndeparteaza:

- a. placa bacteriana
- b. resturile alimentare
- c. tartrul

49. Sigilarea este:

- a. o tehnica de periaj
- b. metoda cea mai simpla de profilaxie primara
- c. igiena alimentatiei

50. Sigilarea se face:

- a. la nivelul gingiei marginale
- b. la nivelul santurilor si gropitelor
- c. la nivelul muchiilor incizale

51. Tesutul dentar este:

- a. vascularizat
- b. nevascularizat
- c. secretor

52. Placa bacteriana este:

- a. placa dentara mobila
- b. indice de igiena orala
- c. aglomerare polimicrobiana

53. O placa bacteriana la maturitate se poate transforma:

- a. în coci
- b. în tartru
- c. în bacili

54. Boala parodontala reprezinta:

- a. o forma particulara de infectie
- b. o placa bacteriana îngrosata
- c. un proces de demineralizare

55. Revelatorii de placa sunt:

- a. metode de colorare "in vivo"
- b. metode de îndepartare a placii bacteriene
- c. adjuvante ale periajului dentar

56. Tartrul dentar poate fi:

- a. parodontal
- b. lingual
- c. supra si sublingual

57. Structura tartrului este:

- a. predominant apoasa
- b. predominant anorganica
- c. predominant organica

58. Dupa îndepartarea tartrului si remineralizare dispare:

- a. sensibilitatea dureroasa
- b. secretia purulenta
- c. mobilitatea fiziologica

59. Detartrajul reprezinta:

- a. un material pentru îndepartarea depozitelor moi
- b. un procedeu laborios pentru îndepartarea tartrului
- c. un instrument special, din otel inoxidabil

60. Periajul dentar profesional asigura:

- a. igienizarea cavitatii orale
- b. îndepartarea profesionala a placii bacteriene supragingivale si a pigmentatiilor
- c. îndepartarea tartrului subgingival

61. Depigmentarile dentare se realizeaza cu:

- a. paste de dinti
- b. benzi sau discuri abrazive
- c. paste abrazive profesionale cu granulatii diferite

62. Placa bacteriana (ca factor etiologic al principalelor afectiuni stomatologice) se depune:

- a. în spatii retentive
- b. în spatii perfect curatate
- c. imediat dupa efectuarea periajului profesional

63. Deglutitia de tip infantil genereaza:

- a. ocluzii prabusite
- b. ocluzii inverse frontale
- c. ocluzii deschise

64. Ce se înțelege prin resuscitare cardio-respiratorie?

- a. combaterea si tratarea afectiunilor pulmonare;
- b. combaterea si tratarea insuficientei cardiace;
- c. masurile întreprinse pentru restabilirea activitatii cardiace;

65. Ce produce întreruperea circulatiei si respiratiei?

- a. anoxie tisulara, ce se resimte în primul rând la nivelul sistemului nervos central;
- b. diminuarea reflexelor osteotendinoase si pupilare;
- c. midriaza pupilara.

66. Ce înțelegem prin moarte clinica?

- a. intervalul de timp între oprirea inimii si moartea neuronilor
- b. oprirea circulatiei si respiratiei
- c. moartea neuronilor datorita anoxiei cerebrale.

67. Când este indicata resuscitarea respiratorie?

- a. în pleurezie
- b. în congestie pulmonara
- c. în insuficienta respiratorie acuta.

68. Care este prima manopra întreprinsa în insuficienta respiratorie?

- a. oxigenoterapie
- b. asigurarea si mentinerea libertatii cailor aeriene
- c. respiratie artificiala

69. Spasmul glotic poate fi provocat de:

- a. înec;
- b. proteze dentare deplasate sau rupte;
- c. intoxicatii cu substante convulsionante.

70. În cazul unor traumatisme mari ale masivului facial, cu fracturi de mandibula și insuficiența respiratorie acută ce facem?

- a. intubație oro-traheală;
- b. traheostomie;
- c. oxigenoterapie;

71. Traheostomia este indicată în:

- a. traumatisme toracice cu fracturi costale multiple și volet costal
- b. intoxicații voluntare
- c. în tratamentul infecțiilor pleuro-pulmonare

72. Care este incizia mai estetică în traheostomie?

- a. incizia verticală
- b. incizia oblică
- c. incizia transversală

73. Oxigenoterapia este un act terapeutic:

- a. etiologic
- b. simptomatic
- c. principal în stopul respirator

74. Cum se realizează masajul cardiac extern?

- a. se apasă cu palma în spațiul V intercostal stâng pe linia medioclaviculară;
- b. se apasă cu podul ambelor palme în 1/3 inferioară a sternului;
- c. se deprime coastele cu 2-3 cm.

75. Ce este antisepsia?

- a. metoda curativă de luptă împotriva infecțiilor
- b. metoda profilactică de luptă împotriva infecțiilor
- c. metoda de îndepărtare și distrugere a microbilor de pe piele, material moale, obiecte din încăperi.

76. Ce este dezinfectia?

- a. metoda de prevenire a infecțiilor plagilor operatorii
- b. metoda curativă de distrugere a microbilor dintr-o plagă
- c. metoda de îndepărtare și distrugere a microbilor de pe piele, plagi, obiecte, plăști urinare...

77. Ce urmărește sterilizarea?

- a. distrugerea tuturor germenilor, inclusiv a formelor sporulate și a virusurilor
- b. dezinfectia cazilor, băilor, plăștilor
- c. profilaxia infecțiilor plagilor operatorii

78. În ce se prepară apa sterilă pentru spălarea mâinilor chirurgului?

- a. se spală cu apă curentă de la robinet
- b. autoclav
- c. pupinel

79. Prin ce metoda se sterilizeaza la autoclav?

- a. vapori chimici sub presiune
- b. aer uscat
- c. vapori supraîncalziti sub presiune

80. Ce sistem de sterilizare a instrumentarului metalic este cel mai bun?

- a. sterilizarea la pupinel
- b. sterilizarea prin caldura umeda la autoclav
- c. sterilizarea prin flambare

81. Care este termenul de valabilitate al sterilizarii instrumentarului chirurgical si materialului moale sterilizat la pupinel sau autoclav?

- a. 24 ore de la efectuarea sterilizarii
- b. termen nelimitat, daca nu s-au deschis cutiile de instrumente sau casoletele.
- c. 48 de ore de la efectuarea sterilizarii

82. Care din elementele de mai jos nu le întâlnim în stomatite?

- a. tumefactia mucoaselor , durere
- b. salivatie abundenta
- c. alterarea profunda a starii generale, hipotensiune, stare de soc

83. Parodontita este:

- a. o inflamatie a cavitatii bucale
- b. o afectiune a gingiilor
- c. o boala care ataca tesaturile de sustinere a dintilor

84. Buza de iepure consta în:

- a. despicultura partiala a valului palatin
- b. despicultura totala a cerului gurii si valului palatin
- c. despicultura intereseaza numai buza superioara

85. Oglizile dentare sunt instrumente de :

- a. examinat
- b. preparare
- c. de mâna

86. Oglinda este folosita la:

- a. la palparea peretilor unei cavitati;
- b. îndepartarea limbii si a obrazului pentru a le proteja în timpul prepararii
- c. îndepartarea dentinei ramolite

87. În examinarea cariilor incipiente este folosita sonda:

- a. dreapta
- b. flexibila (din plastic sau otel)
- c. curba

88. Sonda interproximala este folosita în:

- a. detectarea cariilor proximale
- b. examinarea cariilor incipiente
- c. examinarea suprafetelor dentare inaccesibile privirii

89. Manipularea buletelor de vata pentru a usca dintele se face cu ajutorul:

- a. pensei dentare
- b. sondei
- c. oglinzii

90. Lingurile Black (excavatoarele) sunt folosite la:

- a. îndepartarea dentinei patologice
- b. regularizarea peretelui pulpar
- c. despicarea smaltului

91. Pietrele sunt instrumente rotative care prelucreaza structura prin:

- a. aschiere
- b. taiere
- c. abrazie

92. Discul de carborundum este utilizat:

- a. pentru taierea în laborator sau în cabinet a lucrurilor protetice
- b. în detartraj
- c. îndepartarea depozitelor moi de pe suprafața dinților

93. Eruptia dentara este:

- a. un fenomen social
- b. un fenomen de crestere
- c. o leziune simpla odontala

94. Eruptia dentara este reprezentata de:

- a. mugurele dentar
- b. coroana dentara
- c. migrarea dinților din zona osoasa în cavitatea bucala

95. Incisivii temporari, centrali si laterali au o forma:

- a. diferita de cea a dinților permanenti
- b. aproape identica cu cea a dinților permanenti
- c. asemanatoare cu cea a dinților permanenti

96. Cel de-al doilea molar temporar este o copie fidela a:

- a. molarului de 6 ani
- b. molarului de 12 ani
- c. molarului de minte

97. Camera pulpara a dintilor temporari este:

- a. deosebit de mica fata de cea a dintilor permanenti
- b. deosebit de voluminoasa fata de cea a dintilor permanenti
- c. identica cu cea a dintilor permanenti

98. Datorita predispozitiei sale deosebite la carie molarul de 6 ani este:

- a. un dinte comun
- b. un dinte special în categoria dintilor permanenti
- c. un dinte avantajos ca si pozitie pe arcada.

99. Molarul de 6 ani a fost considerat:

- a. cheia ocluziei
- b. cel mai important dinte de pe arcada
- c. dintele cel mai neimportant de pe arcada

100. Caria profunda pune probleme speciale:

- a. dintilor temporari
- b. dintilor permanenti tineri
- c. dintilor permanenti adulti